

管理番号	236
がん腫	子宮頸
レジメン名	TP+Pembrolziuumab
1 コース日数	21 日
催吐性リスク分類	高度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : アプレピタント Cap125mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : アプレピタント Cap 80mg 1×朝食後+デキサメタゾン錠 4mg 2錠 1×朝食後(DEX は day4 まで)
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg
軽度	Day1 : グラニセトロンゼリー1mg 点滴投与前
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ソルデム 3A 硫酸 Mg	500mL 20mEq	60 分	↓																				
制吐剤 ファモチジン d-クロルフェニラミン	20mg 5mg	30 分(iv)	↓																				
ペムブロリズマブ	200mg/body	30 分	↓																				
パクリタキセル	175mg/m ²	180 分	↓																				
マンニトール S	300mL	60 分	↓																				
シスプラチン	50mg/m ²	120 分	↓																				
ソルデム 3A	1000mL	360 分	↓																				

・備考