

管理番号	93
がん腫	乳腺
レジメン名	FEC
1 コース日数	21 日
催吐性リスク分類	高度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg    Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
制吐剤(iv.)		30 分	↓																				
エピルビシン	100mg/m <sup>2</sup>	15 分	↓																				
フルオロウラシル	500mg/m <sup>2</sup>	15 分	↓																				
シクロホスファミド	500mg/m <sup>2</sup>	30 分	↓																				
メトクロプラミド	5mg3 錠 3×	毎食前	↓	↓	↓	↓																	

・備考

※アプレピタント製剤は内服薬を使用。  
 ※デキサメタゾン錠は Day4 まで内服。