

| | |
|----------|---------------|
| 管理番号 | 32 |
| がん腫 | 卵巣 |
| レジメン名 | dose dense TC |
| 1 コース日数 | 21 日 |
| 催吐性リスク分類 | 高度 |

| | |
|----------|---|
| 催吐性リスク分類 | 使用制吐剤 |
| 高度 | Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後 |
| 中等度 | Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後 |
| 軽度 | Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg |
| 最小度 | なし |

・治療スケジュール

| 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 日数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ジフェンヒドรามミン錠 10mg | 5 錠 | PTX 開始 30 分前 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | ↓ | | | | | | | |
| 制吐剤(iv.) + ファモチジン注 | 20mg | 30 分 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | ↓ | | | | | | | |
| パクリタキセル | 80mg/m ² | 60 分 | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | ↓ | | | | | | | |
| カルボプラチン | AUC5-6 | 60 分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

・備考

アプレピタントは内服薬を使用。
Day8、15 の制吐剤はアプレピタント及び翌日・翌々日のデキサメタゾン錠を省略、デキサメタゾン注は 6.6mg 投与。