

管理番号	72
がん腫	卵巣
レジメン名	Weekly TC+B-mab followed by B-mab
1 コース日数	21 日
催吐性リスク分類	中等度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg      Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ジフェンヒドรามミン錠 10mg	5 錠	PTX 開始 30 分前	↓							↓							↓						
制吐剤(iv.) + ファモチジン注	20mg	30 分	↓							↓							↓						
ベバシズマブ	15mg/kg	90 分	↓																				
パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	60 分	↓							↓							↓						
カルボプラチン	AUC2	60 分	↓							↓							↓						

・備考

ベバシズマブの初回投与時間は 90 分、2 回目は 60 分。  
ベバシズマブは 2 コース目から開始。パクリタキセルとカルボプラチンは 6 コース目まで投与。以降はアバスチン単剤で治療。