

管理番号	46
がん腫	頭頸部
レジメン名	FP1000/75
1 コース日数	28 日
催吐性リスク分類	高度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	...	22	23	...	28			
制吐剤(iv.)		30 分	↓																							
ソルデム 3A 硫酸マグネシウム	1000mL 20mEq	180 分	↓																							
シスプラチン	75mg/m ²	120 分	↓																							
マンニトール S	300mL	60 分	↓																							
ソルデム 3A	1500mL	17 時間 30 分	↓																							
フルオロウラシル	1000mg/m ²	24 時間	↓	↓	↓	↓																				
ソルデム 3A ラクテック	1000mL 1000mL	24 時間		↓	↓	↓																				

・備考

Day2-4 の制吐剤はデキサメタゾン注 3.3mg を使用。
