

管理番号	60
がん腫	頭頸部
レジメン名	5-FU+CBDCA+C-mab
1 コース日数	21 日
催吐性リスク分類	中等度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
制吐剤(iv.)		30 分	↓	↓	↓	↓																		
d-クロルフェニラミン	5mg		↓							↓							↓							
セツキシマブ	250mg/m ²	60 分	↓							↓						↓								
カルボプラチン	AUC5	60 分	↓																					
フルオロウラシル	1000mg/m ²	24 時間	↓	↓	↓	↓																		

・備考

セツキシマブは、初回 400mg/m²、120 分で投与。