

管理番号	66
がん腫	頭頸部
レジメン名	PTX+C-mab
1 コース日数	21 日
催吐性リスク分類	軽度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
制吐剤+ ファモチジン d-クロルフェニラミン	20mg 5mg	30分	↓							↓							↓						
セツキシマブ	250mg/m ²	60分	↓							↓							↓						
パクリタキセル	80mg/m ²	60分	↓							↓							↓						

・備考

セツキシマブは、初回 400mg/m²、120 分にて投与。
制吐剤のデキサメタゾンは、6.6mg を投与。