

管理番号	76
がん腫	頭頸部
レジメン名	FP+C-mab
1 コース日数	21 日
催吐性リスク分類	高度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
制吐剤(iv.)		30 分		↓	↓																		
ヒドロキシジン	50mg	30 分	↓							↓							↓						
セツキシマブ	250mg/m ²	30 分	↓							↓							↓						
フルオロウラシル	800mg/m ²	24 時間	↓	↓	↓	↓																	
ビカネイト®	500mL	90 分	↓																				
マンニトール S	300mL	60 分	↓																				
シスプラチン	80mg/m ²	120 分	↓																				
ビカネイト®	1000mL	8 時間	↓	↓																			

・備考

5-HT3 拮抗薬は、グラニセトロン注 1mg を使用。
セツキシマブの初回投与量は 400mg/m²、初回投与時間は 120 分。