

管理番号	137
がん腫	頭頸部
レジメン名	PTX+CBDCA+C-mab
1 コース日数	21 日
催吐性リスク分類	中等度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 6.6mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
制吐剤(iv.)+ d-クロルフェニラミン	5mg	30 分	↓							↓							↓						
ファモチジン	20mg																						
セツキシマブ	250mg/m ²	60 分	↓							↓							↓						
パクリタキセル	100mg/m ²	60 分	↓							↓													
カルボプラチン	AUC2.5	60 分	↓							↓													

・備考

セツキシマブの初回投与量 400mg/m²、初回投与時間 120 分。