

管理番号	20
がん腫	胃
レジメン名	XP+Trastuzumab (Short hydration)
1 コース日数	21 日
催吐性リスク分類	高度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ソルデム 3A+ 硫酸マグネシウム	1000mL 20mEq	180 分	↓																				
制吐剤(iv.)		60 分	↓																				
トラスツズマブ	6mg/kg	30 分	↓																				
シスプラチン	80mg/m ²	120 分	↓																				
マンニトール S	300mL	30 分	↓																				
ソルデム 3A	1500mL	翌日まで	↓																				
カペシタビン	1000mg/m ²	2×朝夕食後	夕	朝夕	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	朝夕	朝						

・備考

※デキサメタゾンは Day2-4 内服。
 ※トラスツズマブの初回は、投与量 8mg/kg、点滴時間 90 分で投与。
 ※Day2-3 は 1 日 1500mL 飲水すること。