

管理番号	20
がん腫	胃
レジメン名	XP+Trastuzumab
1 コース日数	21 日
催吐性リスク分類	高度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg    Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ソルデム 3A+ 硫酸マグネシウム	1000mL 20mEq	180 分	↓																				
制吐剤(iv.)		60 分	↓																				
トラスツズマブ	6mg/kg	30 分	↓																				
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	120 分	↓																				
マンニトール S	300mL	30 分	↓																				
ソルデム 3A	1500mL	翌日まで	↓																				
ソルデム 3A	1000mL	12 時間		↓	↓																		
ラクテック	1000mL	12 時間		↓	↓																		
カペシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	2×朝夕食後	夕	朝夕	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	朝夕	朝						

・備考

※制吐剤はホスアプレピタントを使用（点滴時間 30 分）。  
 ※デキサメタゾンは Day2-4 内服。  
 ※トラスツズマブの初回は、投与量 8mg/kg、点滴時間 90 分で投与。