

管理番号	183
がん腫	食道
レジメン名	FP800/80+Nivolumab
1 コース日数	21 日
催吐性リスク分類	高度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg 又は アプレピタント Cap125mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : アプレピタント Cap 80mg 1×朝食後+デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝食後 ⇒APR は day1 に cap を投与した場合
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ソルデム 3A 硫酸マグネシウム	1000mL 20mEq	180 分	↓																				
制吐剤		30 分(iv)	↓																				
ニボルマブ	240mg/body	30 分	↓																				
シスプラチン	80mg/m ²	120 分	↓																				
マンニトール S	300mL	60 分	↓																				
ソルデム 3A	1500mL	翌日まで	↓																				
ソルデム 3A	2000mL	24 時間		↓	↓	↓	↓																
フルオロウラシル	800mg/m ²	24 時間	↓	↓	↓	↓	↓																

・備考