社会医療法人　禎心会　札幌禎心会病院

管理番号	3
がん腫	大腸
レジメン名	mFOLFOX6+C-mab
1 コース日数	14 日
催吐性リスク分類	中等度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1：ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3：デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1：パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg　Day2-3：デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1：デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
制吐剤(iv.)+ *d*-クロルフェニラミン 5mg		30 分	↓						↓													
セツキシマブ	250mg/㎡	120 分	↓						↓													
オキサリプラチン	85mg/㎡	120 分	↓																			
レボホリナート	200mg/㎡	120 分	↓																			
フルオロウラシル	400mg/㎡	急速	↓																			
フルオロウラシル	2400mg/㎡	46 時間	↓																			

・備考

セツキシマブの投与量：初回は 400mg/㎡で投与。
セツキシマブの投与時間：初回 120 分、忍容性があれば 2 回目以降 60 分で投与可。

作成日：2019.11.25