

| | |
|----------|-------------|
| 管理番号 | 15 |
| がん腫 | 大腸 |
| レジメン名 | IRIS |
| 1 コース日数 | 28 日 |
| 催吐性リスク分類 | 中等度+アプレピタント |

| | |
|----------|---|
| 催吐性リスク分類 | 使用制吐剤 |
| 高度 | Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後 |
| 中等度 | Day1 : パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後 |
| 軽度 | Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg |
| 最小度 | なし |

・治療スケジュール

| 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 日数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ... | 22 | 23 | ... | 27 | 28 | |
| 制吐剤(iv.) | | 30 分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イリノテカン | 150mg/m ² | 120 分 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-1 | 添付文書参照 | 朝夕食後 | 夕 | 朝夕 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 朝夕 | 朝 | | | | | | | |

・備考

アプレピタントは内服薬を使用。