

管理番号	141
がん腫	大腸
レジメン名	FOLFOXIRI
1 コース日数	14 日
催吐性リスク分類	高度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 6.6mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14															
制吐剤(iv.)		30 分	↓																												
イリノテカン	165mg/m ²	60 分	↓																												
オキサリプラチン	85 mg/m ²	120 分	↓																												
レボホリナート	200mg/m ²		↓																												
フルオロウラシル	200mg/m ²	急速	↓																												
フルオロウラシル	3200mg/m ²	46 時間	↓																												

・備考

アプレピタントは内服薬を使用。
デキサメタゾン錠は Day4 まで内服。