社会医療法人　禎心会　札幌禎心会病院

管理番号	191
がん腫	大腸
レジメン名	Encorafenib+Binimetinib+ bi-weeklyC-mab
1 コース日数	14 日
催吐性リスク分類	最小度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1：ホスアプレピタント注 150mg 又は アプレピタント Cap125mg＋パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3：アプレピタント Cap 80mg 1×朝食後＋デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後　⇒APR は day1 に cap を投与した場合
中等度	Day1：パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg　　Day2-3：デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後
軽度	Day1：デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
デキサメタゾン *d*-クロルフェニラミン	6.6mg 5mg	30 分	↓																			
セツキシマブ	250mg/㎡	90 分	↓																			
エンコラフェニブ	300mg/day	夕食後	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→							
ビニメチニブ	90mg/day	朝夕食後	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→							

・備考

作成日：2022.05.25