

管理番号	198
がん腫	大腸
レジメン名	XELIRI(CAPOX)+B・mab
1 コース日数	21 日
催吐性リスク分類	中等度

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg 又は アプレピタント Cap125mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : アプレピタント Cap 80mg 1×朝食後+デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝食食後 ⇒APR は day1 に cap を投与した場合
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝食食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
制吐剤(iv.)		30 分	↓																				
ベバシズマブ	7.5mg/kg	90 分	↓																				
イリノテカン	200mg/m ²	120 分	↓																				
カペシタビン	800mg/m ²	2×朝夕食後	夕	朝夕	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	朝夕	朝						

・備考

ベバシズマブの投与時間：初回 90 分、忍容性があれば 2 回目 60 分、3 回目以降 30 分で投与可。