

|          |      |
|----------|------|
| 管理番号     | 23   |
| がん腫      | 胆道がん |
| レジメン名    | GEM  |
| 1 コース日数  | 28 日 |
| 催吐性リスク分類 | 軽度   |

|          |   |
|----------|---|
| 催吐性リスク分類 | 使用制吐剤   |
| 高度       | Day1 : ホスアプレピタント注 150mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg<br>Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後 |
| 中等度      | Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg    Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝昼食後                 |
| 軽度       | Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg   |
| 最小度      | なし  |

・治療スケジュール

| 薬剤名      | 投与量                   | 投与時間 | 日数 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |    |
|----------|-----------------------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|----|
|          |                       |      | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ... | 21 | 22 | ... | 28 |
| 制吐剤(iv.) |                       | 30 分 | ↓  |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    | ↓  |    |    |     |    |    |     |    |
| ゲムシタビン   | 1000mg/m <sup>2</sup> | 30 分 | ↓  |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    | ↓  |    |    |     |    |    |     |    |

・備考

|  |
|--|
|  |
|--|