

管理番号	178
がん腫	子宮頸
レジメン名	Weekly CPT-11+CDDP
1 コース日数	28 日
催吐性リスク分類	中等度+アプレピタント

催吐性リスク分類	使用制吐剤
高度	Day1 : ホスアプレピタント注 150mg 又は アプレピタント Cap125mg+パロノセトロン注 0.75mg+デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : アプレピタント Cap 80mg 1×朝食後+デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝食食後 ⇒APR は day1 に cap を投与した場合
中等度	Day1 : パロノセトロン注 0.75mg +デキサメタゾン注 9.9mg Day2-3 : デキサメタゾン錠 4mg2 錠 2×朝食食後
軽度	Day1 : デキサメタゾン注 6.6mg
最小度	なし

・治療スケジュール

薬剤名	投与量	投与時間	日数																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	...	21	22	...	28			
ソルデム 3A	500mL	90 分	↓							↓							↓									
制吐剤(iv.)		30 分	↓							↓							↓									
イリノテカン	60mg/m <sup>2</sup>	60 分	↓							↓							↓									
シスプラチン	20mg/m <sup>2</sup>	60 分	↓							↓							↓									

・備考

※デキサメタゾン錠は、抗がん剤投与 2 日目～4 日目まで内服。

本レジメンは、温熱療法と併用すること。

Day1 に飲水 1000mL をすること。