

【重症度別集計】表

絞込条件

対象年月設定: 201604 ~ 201703
 病院の経営主体選択: 全て
 【詳細】病床数: 下限なし ~ 上限なし
 【詳細】手術の有無: 全て
 【詳細】ステージ集約選択: 有り
 【詳細】年代: 全て
 【詳細】性別: 全て
 【詳細】入院経路: 全て
 並べ替え条件: 退院年月・昇順

■ 退院患者数

(単位: 人(100床あたり))	合計	退院年月								
		2016/04	2016/05	2016/06	2016/07	2016/08	2016/09	2016/10	2016/11	
胃の悪性新生物										
ステージ0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	
ステージI	5.9	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	0.3	0.4	
ステージII	2.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	
ステージIII	2.9	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2	0.1	
ステージIV	5.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
不明	1.8	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	
計	19.0	1.5	1.6	1.8	2.0	1.7	1.6	1.1	1.2	
結腸の悪性新生物										
ステージ0	0.7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	
ステージI	3.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	
ステージII	5.1	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	
ステージIII	10.2	0.6	0.9	0.9	0.8	0.6	0.9	0.9	0.8	
ステージIV	9.8	1.0	0.8	0.7	1.0	0.9	0.7	0.8	0.6	
不明	2.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	
計	31.1	2.3	2.5	2.6	2.7	2.2	2.6	2.7	2.2	
直腸の悪性新生物										
ステージ0	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	
ステージI	1.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	
ステージII	2.7	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	0.3	0.1	
ステージIII	3.8	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	
ステージIV	7.4	0.5	0.4	0.6	0.9	0.9	0.7	0.6	0.4	
不明	0.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	
計	16.9	1.2	1.4	1.3	1.5	1.8	1.4	1.5	1.1	
気管支および肺の悪性新生物										
ステージ0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ステージI	3.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	
ステージII	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	
ステージIII	3.7	0.5	0.4	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	
ステージIV	5.9	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	
不明	3.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	
計	16.7	1.9	1.3	1.2	1.3	1.2	1.4	1.0	1.4	
急性心筋梗塞										
Killip I	5.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	
Killip II	2.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	
Killip III	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	
Killip IV	1.3	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	
不明	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	9.5	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.7	0.9	0.7	
肺炎										
軽症	18.0	1.4	1.0	1.5	1.4	1.3	1.2	1.3	1.1	
中等症	5.4	0.5	0.2	0.5	0.2	0.6	0.2	0.4	0.4	
重症	26.4	2.5	1.8	1.7	1.7	2.0	1.7	1.9	1.8	
不明	9.9	0.5	1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
計	59.7	4.9	4.0	4.5	4.2	4.8	4.0	4.5	4.2	
喘息										
軽症間欠型	2.8	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.2	
軽症持続型	2.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	
中等症持続型	2.8	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	
重症持続型	1.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	
不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
計	8.7	0.9	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	1.1	0.9	
脳梗塞										
JCS 0-1	23.7	1.6	1.7	1.7	1.6	2.4	1.9	2.0	1.5	
JCS 2-3	10.5	0.6	1.0	0.9	1.0	1.1	0.5	0.8	0.8	
JCS 10-100	3.0	0.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))	合計	退院年月			
		2016/12	2017/01	2017/02	2017/03
胃の悪性新生物					
ステージ0	0.7	0.1	0.0	0.2	0.1
ステージI	5.9	0.8	0.5	0.6	0.6
ステージII	2.3	0.1	0.1	0.1	0.2
ステージIII	2.9	0.2	0.1	0.2	0.2
ステージIV	5.4	0.5	0.3	0.3	0.6
不明	1.8	0.2	0.2	0.2	0.1
計	19.0	1.9	1.2	1.6	1.8
結腸の悪性新生物					
ステージ0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.1
ステージI	3.2	0.4	0.2	0.5	0.4
ステージII	5.1	0.4	0.3	0.4	0.4
ステージIII	10.2	0.9	0.8	0.8	1.3
ステージIV	9.8	0.9	0.7	0.9	0.8
不明	2.1	0.2	0.2	0.3	0.3
計	31.1	2.9	2.2	2.9	3.3
直腸の悪性新生物					
ステージ0	0.7	0.1	0.1	0.0	0.1
ステージI	1.5	0.0	0.1	0.1	0.1
ステージII	2.7	0.3	0.2	0.2	0.2
ステージIII	3.8	0.4	0.3	0.4	0.4
ステージIV	7.4	0.8	0.7	0.6	0.3
不明	0.8	0.1	0.1	0.0	0.1
計	16.9	1.7	1.5	1.3	1.2
気管支および肺の悪性新生物					
ステージ0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ステージI	3.2	0.4	0.1	0.3	0.3
ステージII	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0
ステージIII	3.7	0.4	0.3	0.4	0.4
ステージIV	5.9	0.7	0.4	0.4	0.5
不明	3.3	0.5	0.2	0.3	0.2
計	16.7	2.1	1.1	1.4	1.4
急性心筋梗塞					
Killip I	5.2	0.4	0.3	0.4	0.6
Killip II	2.1	0.3	0.1	0.3	0.1
Killip III	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1
Killip IV	1.3	0.1	0.1	0.0	0.1
不明	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
計	9.5	0.9	0.6	0.8	0.9
肺炎					
軽症	18.0	2.1	1.7	2.1	1.9
中等症	5.4	0.5	0.7	0.6	0.6
重症	26.4	2.6	3.0	3.4	2.3
不明	9.9	0.9	0.5	0.9	0.8
計	59.7	6.1	5.9	7.0	5.6
喘息					
軽症間欠型	2.8	0.5	0.2	0.1	0.2
軽症持続型	2.1	0.1	0.1	0.3	0.2
中等症持続型	2.8	0.2	0.2	0.2	0.2
重症持続型	1.0	0.1	0.1	0.0	0.1
不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計	8.7	0.9	0.6	0.6	0.7
脳梗塞					
JCS 0-1	23.7	2.8	1.9	2.3	2.3
JCS 2-3	10.5	0.9	0.8	1.3	0.8
JCS 10-100	3.0	0.3	0.3	0.4	0.1

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	退院年月							
			2016/04	2016/05	2016/06	2016/07	2016/08	2016/09	2016/10	2016/11
脳梗塞	JCS 200-300	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	38.0	2.4	3.1	2.8	2.7	3.7	2.7	3.3	2.7
脳出血	JCS 0-1	6.3	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
	JCS 2-3	3.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3
	JCS 10-100	3.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3
	JCS 200-300	2.6	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	15.3	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.3
糖尿病	軽症	6.0	0.8	0.4	0.7	0.4	0.5	0.7	0.5	0.4
	中等症	3.6	0.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2
	重症	1.6	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	11.2	1.3	0.7	1.4	0.9	0.8	1.3	1.0	0.7
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	6.1	0.7	0.6	0.7	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3
	重症度Ⅱ	3.4	0.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
	重症度Ⅲ	2.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2
	重症度Ⅳ	0.8	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	12.9	1.5	0.9	1.2	0.9	0.8	0.9	1.0	0.8
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	4.0	0.3	0.4	0.3	0.6	0.2	0.3	0.3	0.3
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	4.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.2	0.3	0.4	0.3
急性腸炎	血便なし	16.5	1.8	1.5	1.3	1.6	1.4	1.2	1.0	1.3
	血便あり	1.7	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	18.2	2.0	1.6	1.4	1.9	1.6	1.4	1.1	1.4
急性虫垂炎	白血球15000/mm ³ 未満	9.1	0.8	1.0	0.9	0.7	1.0	0.7	0.9	0.5
	白血球15000/mm ³ 以上	3.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	12.4	1.1	1.5	1.3	1.0	1.4	0.9	1.2	0.7
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	28.4	2.8	2.2	2.3	2.6	2.6	2.5	2.4	2.1
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	2.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	30.8	3.1	2.3	2.5	2.8	2.9	2.7	2.6	2.4
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前立腺容積50ml未満	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
	前立腺容積50ml以上	1.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1
	不明	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	1.6	0.2	0.1	0.3	0.3	0.0	0.2	0.0	0.1
白内障	1眼(処置対象のもの)	19.0	1.6	1.3	1.9	1.5	1.4	1.4	1.8	1.0
	2眼(処置対象のもの)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	19.0	1.6	1.3	1.9	1.5	1.4	1.4	1.8	1.0
痔核	第一度(出血のみ)	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
	第二度(還納可能)	0.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1
	第三度(脱肛)	1.8	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	3.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	3.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.3	0.2
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	3.6	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.1	0.4	0.2
狭心症	重症度の指標なし	53.6	5.0	3.9	5.3	4.6	4.3	4.0	3.8	3.6
	計	53.6	5.0	3.9	5.3	4.6	4.3	4.0	3.8	3.6
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	6.0	0.6	0.4	0.3	0.6	0.8	0.6	0.5	0.4
	水腎・水尿管あり	5.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	退院年月			
			2016/12	2017/01	2017/02	2017/03
脳梗塞	JCS 200-300	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	38.0	4.1	3.1	4.1	3.3
脳出血	JCS 0-1	6.3	0.8	0.4	0.5	0.7
	JCS 2-3	3.3	0.3	0.2	0.5	0.2
	JCS 10-100	3.1	0.3	0.3	0.4	0.5
	JCS 200-300	2.6	0.2	0.2	0.3	0.3
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	15.3	1.6	1.1	1.7	1.7
糖尿病	軽症	6.0	0.3	0.2	0.5	0.6
	中等症	3.6	0.3	0.2	0.2	0.3
	重症	1.6	0.2	0.1	0.0	0.2
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	11.2	0.8	0.5	0.7	1.1
大腿骨頸部骨折	重症度Ⅰ	6.1	0.7	0.5	0.5	0.4
	重症度Ⅱ	3.4	0.3	0.5	0.4	0.3
	重症度Ⅲ	2.6	0.4	0.2	0.2	0.2
	重症度Ⅳ	0.8	0.1	0.1	0.0	0.1
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	12.9	1.5	1.3	1.1	1.0
胃潰瘍	ショックなし(収縮期血圧90mmHg以上)	4.0	0.5	0.1	0.3	0.4
	ショックあり(収縮期血圧90mmHg未満)	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	4.4	0.6	0.2	0.4	0.4
急性腸炎	血便なし	16.5	1.7	1.4	1.0	1.3
	血便あり	1.7	0.0	0.1	0.2	0.1
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	18.2	1.7	1.5	1.2	1.4
急性虫垂炎	白血球15000/mm3未満	9.1	0.7	0.6	0.9	0.4
	白血球15000/mm3以上	3.3	0.2	0.1	0.1	0.3
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	12.4	0.9	0.7	1.0	0.7
胆石症	黄疸なし(T Bill 5mg/dl 未満)	28.4	2.3	2.0	2.3	2.3
	黄疸あり(T Bill 5mg/dl 以上)	2.4	0.2	0.2	0.1	0.1
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	30.8	2.5	2.2	2.4	2.4
前立腺肥大症	前立腺容積20ml未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前立腺容積50ml未満	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0
	前立腺容積50ml以上	1.0	0.1	0.0	0.1	0.0
	不明	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
	計	1.6	0.2	0.1	0.1	0.0
白内障	1眼(処置対象のもの)	19.0	1.4	1.5	2.2	2.0
	2眼(処置対象のもの)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	19.0	1.4	1.5	2.2	2.0
痔核	第一度(出血のみ)	1.0	0.1	0.0	0.0	0.2
	第二度(還納可能)	0.8	0.1	0.0	0.0	0.3
	第三度(脱肛)	1.8	0.1	0.1	0.3	0.2
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	3.6	0.3	0.1	0.3	0.7
子宮筋腫	貧血なし(Hb10g/dl以上)	3.0	0.2	0.3	0.4	0.3
	貧血あり(Hb10g/dl未満)	0.6	0.1	0.0	0.0	0.2
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	3.6	0.3	0.3	0.4	0.5
狭心症	重症度の指標なし	53.6	4.4	3.7	5.3	5.7
	計	53.6	4.4	3.7	5.3	5.7
腎結石及び尿管結石	水腎・水尿管なし	6.0	0.5	0.4	0.4	0.5
	水腎・水尿管あり	5.2	0.4	0.1	0.7	0.5

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	退院年月							
			2016/04	2016/05	2016/06	2016/07	2016/08	2016/09	2016/10	2016/11
腎結石及び尿管結石	不明	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
	計	11.5	1.1	0.8	0.7	1.0	1.5	1.2	0.8	0.8
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
	ステージI	4.9	0.4	0.3	0.2	0.7	0.4	0.3	0.5	0.3
	ステージII	4.2	0.1	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3
	ステージIII	1.8	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	ステージIV	0.9	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	不明	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	計	13.9	0.9	1.2	0.8	1.6	1.2	1.0	1.2	1.0
膝関節症	骨移植なし	2.4	1.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1
	骨移植あり	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	2.7	1.0	0.6	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	17.5	1.3	1.3	1.6	1.8	1.8	1.5	1.1	1.4
	計	17.5	1.3	1.3	1.6	1.8	1.8	1.5	1.1	1.4
全疾患合計		431.8	38.2	33.5	36.1	36.4	36.4	33.5	34.0	30.6
集計病院数		-	9	10	10	10	10	10	11	11

【重症度別集計】表

(単位:人(100床あたり))		合計	退院年月			
			2016/12	2017/01	2017/02	2017/03
腎結石及び尿管結石	不明	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
	計	11.5	1.0	0.5	1.1	1.0
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.8	0.0	0.1	0.0	0.3
	ステージI	4.9	0.6	0.3	0.4	0.5
	ステージII	4.2	0.2	0.5	0.4	0.3
	ステージIII	1.8	0.1	0.1	0.3	0.3
	ステージIV	0.9	0.0	0.1	0.0	0.0
	不明	1.3	0.2	0.1	0.1	0.1
	計	13.9	1.1	1.2	1.2	1.5
膝関節症	骨移植なし	2.4	0.0	0.0	0.1	0.1
	骨移植あり	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
	不明	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	計	2.7	0.1	0.0	0.1	0.1
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	17.5	1.7	1.0	1.5	1.5
	計	17.5	1.7	1.0	1.5	1.5
全疾患合計		431.8	40.7	32.1	40.4	39.9
集計病院数		-	11	11	10	10